

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak kasar enzim  $\alpha$ -amilase yang diproduksi sebanyak 2L memiliki aktivitas unit sebesar 184 U/mL, kandungan protein 0,166 mg/mL, dan aktivitas spesifik sebesar 1.109 U/mg.
2. Hasil pemurnian enzim  $\alpha$ -amilase yang dihasilkan sebanyak 481 mL mempunyai aktivitas unit sebesar 157 U/mL, kandungan protein 0,01 mg/mL, aktivitas spesifik sebesar 15.720 U/mg dan perolehan = 20%. Enzim  $\alpha$ -amilase hasil pemurnian mempunyai suhu optimum 60°C, harga  $K_M = 2,85 \text{ mg mL}^{-1}$  substrat, harga  $V_{\text{maks}} = 71,428 \mu\text{mol mL}^{-1} \text{ menit}^{-1}$ ,  $t_{1/2} = 7,875 \text{ menit}$ ,  $k_i = 0,088 \text{ menit}^{-1}$ , dan  $\Delta G_i = 99,95 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
3. Enzim hasil amobilisasi mengalami perubahan suhu optimum menjadi 65°C. Enzim hasil amobilisasi mempunyai nilai  $K_M = 3,125 \text{ mg mL}^{-1}$  substrat, harga  $V_{\text{maks}} = 62,5 \mu\text{mol mL}^{-1} \text{ menit}^{-1}$ ,  $t_{1/2} = 28,875 \text{ menit}$ ,  $k_i = 0,024 \text{ menit}^{-1}$ ,  $\Delta G_i = 103,53 \text{ kJ mol}^{-1}$  dan enzim hasil amobilisasi dapat digunakan hingga 6 kali pemakaian.

**B. Saran**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang optimasi pengikatan enzim  $\alpha$ -amilase dengan CM-selulosa secara kromatografi penukar ion dan mencari alternatif matriks pengamobil selain CM-selulosa.