

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara durasi DM tipe 2 dengan kejadian disfungsi seksual pada wanita di RS Natar Medika Bandar Lampung.
2. Prevalensi pasien DM tipe 2 yang mempunyai durasi DM <5 tahun terdapat 22 responden (52,4%) dan sebanyak 20 responden (47,6%) memiliki durasi 5 tahun.
3. Prevalensi disfungsi seksual pada wanita DM tipe2 di RS Natar Medika Lampung, terdapat 23 responden (54,8%) yang mengalami disfungsi seksual dan 19 responden (45,2%) tidak mengalami disfungsi seksual.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian , peneliti menyarankan agar :

1. Untuk peneliti lain agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan waktu yang lebih lama agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Untuk masyarakat khususnya pasien DM agar lebih mewaspadaai atau sedini mungkin mencegah komplikasi pada penyakit DM agar tidak mengalami kejadian disfungsi seksual.
3. Untuk tenaga kesehatan agar bisa mendiagnosis secara cepat dan tepat sehingga kejadian disfungsi seksual bisa dicegah dan diatasi serta tidak menurunkan kulaitas hidup pasien.