**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA (*Carica papaya*L.)
SEBAGAI FUNGISIDA ALAMI TERHADAP JAMUR
Colletotrichum capsici (Syd.) Butler & Bisby PENYEBAB
PENYAKIT ANTRAKNOSA PADA TANAMAN
CABAI MERAH (*Capsicum annum*L.)**

(Skripsi)

**Oleh
Kadek Ariani**

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya* L.) sebagai Fungisida Alami terhadap Jamur *Colletotrichum capsici* (Syd.) Butler & Bisby Penyebab Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum* L.)

Oleh

Kadek Ariani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak dan jenis kelamin daun pepaya sebagai fungisida alami pada tanaman cabai merah yang terinfeksi jamur *Colletotrichum capsici* penyebab penyakit antraknosa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai bulan Maret 2016 di Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan dimana ulangan sebagai kelompok. Faktor A konsentrasi ekstrak daun pepaya dengan 6 taraf, yaitu 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, dan faktor B jenis kelamin pepaya dengan 3 taraf, yaitu pepaya betina (B1), hermaprodit (B2) dan jantan (B3). Parameter yang diamati adalah keterjadian penyakit, keparahan penyakit antraknosa, tinggi tanaman dan berat basah tanaman cabai merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara konsentrasi dan jenis kelamin ekstrak daun pepaya. Konsentrasi 5 % (A5) dan jenis kelamin betina (B1) merupakan ekstrak yang terbaik untuk menekan keterjadian dan keparahan penyakit, dibandingkan dengan konsentrasi dan jenis ekstrak daun pepaya yang lain.

Kata kunci : Antraknosa, cabai merah (*Capsicum annum* L.), ekstrak daun pepaya (*Carica papaya* L.).

**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA (*Carica papaya*L.)
SEBAGAI FUNGISIDA ALAMI TERHADAP JAMUR
Colletotrichum capsici (Syd.) Butler & Bisby PENYEBAB
PENYAKIT ANTRAKNOSA PADA TANAMAN
CABAI MERAH (*Capsicum annum*L.)**

**Oleh
Kadek Ariani**

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA SAINS

Pada

Jurusan Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA (*Carica papaya* L.) SEBAGAI FUNGISIDA ALAMI TERHADAP JAMUR *Colletotrichum capsici* (Syd.) Butler & Bisby PENYEBAB PENYAKIT ANTRAKNOSA PADA TANAMAN CABAI MERAH (*Capsicum annum* L.)**

Nama Mahasiswa : **Kadek Ariani**

No. Pokok Mahasiswa : 1117021026

Jurusan : Biologi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dra. Yulianty, M.Si.
NIP 19650713 199103 2 002

Pembimbing II

Dra. Tundjung Tripeni H, M.S.
NIP 19580624 198403 2 002

2. Ketua Jurusan Biologi FMIPA

Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc.
NIP 19660305 199103 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Yulianty, M.Si.**

Sekretaris : **Dra. Tundjung Tripeni H, M.S.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dra. Martha Lulus Lande, M.P.**

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D.
NIP. 19710212 199512 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Juli 2016**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Kadek Ariani
NPM : 1117021026
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan : Biologi
Alamat : Kampung Aji Permai, T. Buah, Kec. Gedung Aji, Kab.
Tulang Bawang.

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2016

Menyatakan,

Kadek Ariani
NPM. 1117021026

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tugu Sempurna, Lubuk Linggau pada 15 Juli 1993. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara sebagai buah kasih pasangan Bapak Wayan sukate dan Ibu Ketut Kariani.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Tugu Sempurna, pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banjar Agung, Tulang Bawang pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1Melaya, Jembrana pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Biologi Umum, Struktur Perkembangan Tumbuhan, Pengenalan Alat Laboratorium. Selain itu, penulis juga pernah aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMBIO) sebagai anggota divisi Danus pada tahun 2012-2013 dan anggota KPD pada periode 2013-2014, dan Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu (UKMH) sebagai anggota Kewirausahaan pada tahun 2011 - 2013.

Kemudian penulis menyelesaikan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan Program Kerja Praktek (KP), di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung.

PERSEMBAHAN

*Avignam astu tat astu, teriring doa dan syukur kepada tuhan yang maha esa,
penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai satu tanda bakti dan kasih
yang tulus kepada:*

*Ibu dan bapak tersayang atas doa dan rasa cintanya yang telah
membesarkanku, mendidikku, dan menyanggiku dengan ketulusan hati yang
tak pernah bisa terbayar*

*Putu Eka Wardani, Komang yudi aryana dan Nila anggita atas kebersamaan,
doa, dukungan, dan kasih sayangnya selama ini*

*Para guru dan dosen yang dengan tulus dan sabar dalam mendidik dan
memberikan ilmunya kepadaku*

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTTO

*Sukses bukanlah terlahir dari takdir tetapi dari kerja keras dan usaha
“ kadek ariani”*

*Setiap cita-cita yang terukir merupakan motivasi untuk maju ke
depan dan tujuan hidup*

*“Jadikanlah sabar dan syukur sebagai penolongmu, sesungguhnya
tuhan beserta orang-orang yang sabar.”*

*“Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik
daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil
terpelihara tanpa berkarya” “Bhagawad Gita “11-8”*

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada tuhan yang maha esa, atas berkah, rahmat dan karunia-nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi dengan judul “**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA (*Carica papaya L.*) SEBAGAI FUNGISIDA ALAMI TERHADAP JAMUR *Colletotrichum capsici* (Syd.) Butler & Bisby PENYEBAB PENYAKIT ANTRAKNOSA PADA TANAMAN CABAI MERAH (*Capsicum Annnuum L.*)**” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra.Yulianty, M,Si., selaku pembimbing I yang telah membimbing, menasehati, serta memberikan ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dra.Tundjung Tripeni Handayani, M.S., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, dukungan, ilmu, dan motivasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Martha Lulus Lande, M.P., selaku pembahas yang telah memberikan motivasi, saran, ilmu serta nasihat sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Dra. Christina Nugroho Ekowati, M.Si., selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan saran kepada penulis.
5. Ibu Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung.
6. Bapak Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D., selaku Dekan FMIPA Universitas Lampung.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawandi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang telah memberi ilmu, doa, dukungan dan bimbingan.
8. Kedua Orang Tua ku, Bapak Wayan Sukate dan Ibu Ketut Kariani, terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa dan kasih sayang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis. Kakak ku Putu Eka Wardani dan Adik - adik ku tersayang Komang Yudi Aryana dan Nila Anggita.
9. Sahabat-sahabat, Uci, Agra, Dewi, Wida, Dwi, Eka, Sarah, Sugi, Riska yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman Biologi angkatan 2011, kakak dan adik-adik angkatan atas dukungan, semangat dan doanya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar KKN Ulubelu, Tanggamus dan kelompok KKN (Tiffany, Icha, Umpu, Ulung, Okta, Dwika, dan Mouly) untuk semangat dan dukungan yang besar bagi penulis.
12. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Tuhan membalas kasih sayang kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang bersifat membangun dari setiap pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis

Kadek Ariani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Hipotesis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanaman Cabai Merah (<i>Capsicum annum</i>L.)	8
1. Klasifikasi dan Deskripsi Tanaman Cabai Merah	8
B. Penyakit Antraknosa	11
C. Jamur <i>Colletotrichum capsici</i>.....	12
D. Fungisida	14
E. Tanaman Pepaya (<i>Carica papaya</i>.L)	17
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	19
B. Alat dan Bahan	19
C. Rancangan Penelitian.....	20
D. Prosedur Penelitian	20

1. Pembuatan Media (Potato Dextrose Agar) PDA	20
2. Perbanyak Isolat Murni Jamur <i>Colletotrichum capsici</i>	21
3. Penyiapan Media Tanam	21
4. Penyemaian Benih Cabai Merah.....	21
5. Penanaman Benih Cabai Merah.....	21
6. Pembuatan Ekstrak Daun Pepaya (<i>Carica papaya</i> L.)	22
7. Inokulasi	22
8. Aplikasi Ekstrak Daun Pepaya	22
9. Pengamatan	23
E. Analisis Data	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Pengamatan	26
1. Keterjadian Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah	26
2. Keparahan Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah	28
3. Tinggi Tanaman Cabai Merah	31
4. Berat Basah Tanaman Cabai Merah	33
B. Pembahasan	36
1. Keterjadian Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah	36
2. Keparahan Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah	38
3. Tinggi Tanaman Cabai Merah	40
4. Berat Basah Tanaman Cabai Merah	41
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Uji BNT keterjadian penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun pepaya	26
Tabel 2. Uji BNT keterjadian penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah dengan berbagai jenis kelamin ekstrak daun pepaya	27
Tabel 3. Uji BNT keparahan penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun pepaya	29
Tabel 4. . Uji BNT keparahan penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah yang diperlakukan dengan berbagai jenis kelamin ekstrak daun pepaya	30
Tabel 5. Uji BNT tinggi tanaman cabai merah dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun pepaya	31
Tabel 6. Uji BNT tinggi tanaman cabai merah dengan berbagai jenis kelamin ekstrak daun pepaya	32
Tabel 7. Uji BNT berat basah tanaman cabai merah dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun pepaya	33
Tabel 8. Uji BNT berat basah tanaman cabai merah dengan berbagai jenis kelamin ekstrak daun pepaya	34
Tabel 9. Data keterjadian penyakit antraknosa	49
Tabel 10. Uji kehomogenan keterjadian penyakit antraknosa	49
Tabel 11. Analisis ragam keterjadian penyakit antraknosa.....	50
Tabel 12. Data keparahan penyakit antraknosa.....	50
Tabel 13. Uji kehomogenan keparahan penyakit antraknosa	51
Tabel 14. Analisis ragam keparahan penyakit antraknosa	51

Tabel 15. Data tinggi tanaman	52
Tabel 16. Uji kehomogenan tinggi tanaman	52
Tabel 17. Analisis ragam tinggi tanaman	53
Tabel 18. Data berat basah tanaman	53
Tabel 19. Uji kehomogenan berat basah	54
Tabel 20. Analisis ragam berat basah	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Buah Cabai Merah yang Terserang Penyakit Antraknosa Akibat Infeksi Jamur <i>Colletotrichum capsici</i>	11
Gambar 2. Grafik keterjadian penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah terhadap konsentrasi ekstrak daun pepaya	27
Gambar 3. Grafik jenis kelamin ekstrak daun pepaya terhadap keterjadian Penyakit antraknosa.....	28
Gambar 4. Grafik konsentrasi ekstrak daun pepaya pada keparahan penyakit antraknosa.....	29
Gambar 5. Grafik jenis kelamin ekstrak daun pepaya pada keparahan penyakit antraknosa	30
Gambar 6. Grafik konsentrasi ekstrak daun pepaya terhadap tinggi tanaman cabai merah	31
Gambar 7. Grafik jenis kelamin ekstrak daun pepaya terhadap tinggi tanaman cabai merah	32
Gambar 8. Grafik konsentrasi ekstrak daun pepaya terhadap berat basah tanaman cabai merah	34
Gambar 9. Grafik jenis kelamin ekstrak daun pepaya terhadap berat basah tanaman cabai merah.....	35
Gambar 10. Penyemaian pada petridisk.....	55
Gambar 11. Media tanam	55
Gambar 12. Media PDA	55
Gambar 13. Tanaman cabai merah	56
Gambar 14. Isolat jamur <i>C. capsici</i>	56

Gambar 15. Konidia dengan kerapatan 10^6 / ml	56
Gambar 16. Penyemprotan jamur <i>C. capsici</i>	57
Gambar 17. Setelah disemprot jamur <i>C. capsici</i>	57
Gambar 18. Aquades steril	57
Gambar 19. Ekstrak daun pepaya	58
Gambar 20. Penyemprotan ekstrak daun pepaya	58
Gambar 21. Tanaman yang terserang jamur <i>C. capsici</i>	58
Gamabr 22. Setelah disemprot ekstrak daun pepaya	59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cabai merah (*Capsicum annuum* L.) merupakan salah satu tanaman hortikultura penting di Indonesia. Buah cabai merah umumnya digunakan sebagai bumbu dapur dan penyedap makanan serta dalam pembuatan produk-produk olahan industri dan pengobatan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1997).

Kandungan yang terdapat di dalam cabai antara lain adalah protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin (A, C, dan B1), serta senyawa capsaicin, flavonoid, dan minyak essensial (Bosland and Votava, 2000).

Di Indonesia, cabai merah menjadi salah satu komoditas hortikultura dengan nilai ekonomi yang penting. Terdapat banyak varietas cabai yang dibudidayakan oleh masyarakat, salah satunya adalah cabai merah (*Capsicum annuum* L.)

Cabai merah (*C. annuum* L.) merupakan cabai yang memiliki bentuk, warna, serta tingkat kepedasan yang beragam. Cabai merah merupakan jenis cabai yang paling banyak dimanfaatkan dan sangat disukai oleh masyarakat,

sehingga cabai merah merupakan bahan makanan dengan nilai ekonomis yang tinggi (Poulos 1994).

Di Indonesia, beberapa tanaman cabai merah banyak dibudidayakan karena sesuai dengan kondisi alam. Meskipun demikian, masih terdapat banyak kendala untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal. Salah satu kendala yang paling besar adalah adanya gangguan penyakit yang dapat menyerang sejak tanaman di persemaian sampai tanaman dipanen.

Antraknosa merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman cabai. Penyakit antraknosa pada tanaman cabai banyak disebabkan oleh jamur *Colletotrichum capsici*. Adanya infeksi jamur ini berakibat pada menurunnya produksi cabai dalam jumlah besar serta menurunnya nilai jual cabai yang telah terinfeksi oleh jamur (Pakdeevaporn *et al.*, 2005).

Penyakit antraknosa dapat menimbulkan kehilangan hasil mencapai 50%, bahkan di negara berkembang seperti di *Thailand* kehilangan hasil mencapai 80% (Than *et al.*, 2008). Pada tahun 2002 di Provinsi Lampung khususnya di daerah Liwa sebagai sentra penanaman cabe kehilangan hasil akibat serangan patogen ini mencapai 70%.

Colletotrichum capsici sebagai patogen penyakit antraknosa dapat menyerang setiap bagian tanaman. Serangan pada batang dan daun tidak menimbulkan masalah yang berarti bagi tanaman, tetapi dari bagian inilah penyakit dapat berkembang ke buah dan dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. *Colletotrichum* sp. merupakan patogen yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan infeksi laten (Jefries *et al.*, 1990).

Buah yang terserang akan menimbulkan gejala bercak berwarna hitam dan dapat berkembang menjadi busuk lunak. Serangan yang berat dapat menyebabkan seluruh buah mengering, keriput dan buah menjadi rontok ke tanah. Patogen dapat juga menyerang pada buah yang sudah dipetik. Penyakit akan berkembang selama dalam pengangkutan dan dalam penyimpanan, sehingga panen akan cepat busuk dan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Usaha pengendalian penyakit yang banyak dilakukan oleh para petani adalah penggunaan fungisida sintetis secara intensif. Pengendalian dengan fungisida sintetis dapat menimbulkan berbagai masalah (Than *et al.*, 2008). Pengendalian seperti ini memerlukan biaya besar dan juga efek residunya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Efek residu fungisida dapat mematikan jasad sasaran yang banyak bermanfaat bagi kelangsungan ekosistem di alam. Manusia sebagai konsumen tidak lepas dari pengaruh negatif residu fungisida yang terdapat pada buah cabai. Banyak bahan aktif pestisida dapat mengganggu kesehatan manusia, misalnya dapat merangsang pertumbuhan sel-sel kanker. Oleh karena itu penggunaan pestisida sebagai pengendali penyakit tanaman harus ditekan sekecil mungkin dan sebagai penggantinya harus dicari suatu bahan yang bersifat alami yang bertindak sebagai fungisida tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan maupun manusia. Beberapa jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai fungisida alami antara lain mindi (*Melia azedarch* L.), nimba (*Azadiracta indica* Juss.), dan urang aring (*Eclipta alba*) dapat menekan perkembangan jamur penyebab penyakit antraknosa (Widyastuti, 1996).

Senyawa yang diketahui bersifat fungisida dan bakterisida diantaranya adalah saponin. Saponin bersifat larut dalam air dan etanol (Robinson, 1991). Banyak jenis saponin menunjukkan aktivitas antimikroba dan keberadaan saponin dapat menjadi indikator ketahanan suatu jenis tumbuhan terhadap infeksi jamur (Osborn 1996). Saponin mempunyai aktivitas biologis seperti aktivitas antimikroba yaitu dengan cara membentuk kompleks dalam membran plasma sehingga menghancurkan sifat permeabilitas dinding sel yang selanjutnya menimbulkan kematian sel .

Tanaman pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Pusat penyebaran tanaman ini berada di daerah sekitar Meksiko bagian Selatan dan Nikaragua. Tanaman pepaya ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber buah segar, bahan sayuran serta bahan obat tradisional. Beberapa kandungan zat yang terdapat pada tanaman pepaya diantaranya enzim papain, alkaloid, glikosid, karposid, saponin, lisosim, lipase, dan glutamin. Batang, daun dan buah pepaya mengandung getah berwarna putih. Getah ini mengandung suatu enzim pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut *papain* (Suriawiria, 2002)

Berdasarkan penelitian para ahli, diketahui daun pepaya mengandung 35 mg/100 mg Tocophenol. Sementara itu, daun pepaya muda juga diketahui banyak mengandung zat bernama alkaloid juga enzim papain. Sementara itu, pada daun pepaya yang sudah tua, senyawa yang dominan justru fenolik. Seorang ahli bernama Suhartono, secara umum menyimpulkan bahwa, daun pepaya mengandung 3 varian enzim yakni papain sebanyak 10%, Khimoprotein sebanyak

45% dan juga Lisozim sebanyak 20% per 100%. Enzim khimoprotein sendiri berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi hidrolisis antara protein dengan polipeptida. Sementara itu enzim lisozim berperan sebagai anti-bakteri dan bekerja dengan cara memecah dinding sel pada bakteri.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi dan jenis kelamin ekstrak daun pepaya yang efektif sebagai fungisida alami pada tanaman cabai merah yang terinfeksi jamur *Colletotrichum capsici* penyebab penyakit antraknosa.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi petani tentang manfaat ekstrak daun pepaya (*Carica papaya* L.) yang berpotensi sebagai fungisida alami pada tanaman cabai merah dalam mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur *C. capsici*.

D. Kerangka Pemikiran

Cabai merah (*Capsicum annum* L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat disukai oleh masyarakat yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan cabai terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Budidaya tanaman cabai akhir-akhir

ini mengalami permasalahan cukup serius. Permasalahan tersebut mengakibatkan menurunnya produksi cabai. Salah satu penyebab belum tercapainya potensi hasil tersebut adalah serangan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan tanaman mengalami kerusakan parah dan dapat berakibat gagal panen.

Penyakit antraknosa disebabkan oleh jamur *Colletotrichum capsici*, *C. gloeosporioides*, *C. acutatum*, dan *C. dematium* yang umum dijumpai pada tanaman cabai. Patogen tersebut dapat bertahan pada biji dalam waktu yang cukup lama dengan membentuk *asevulus*, sehingga merupakan penyakit tular biji. Gejala serangan penyakit antraknosa pada buah cabai ditandai dengan buah busuk berwarna kuning-coklat dan diikuti oleh busuk basah yang terkadang ada jelaganya berwarna hitam. Sedangkan pada biji dapat menimbulkan kegagalan berkecambah atau bila telah menjadi kecambah dapat menyebabkan rebah kecambah. Pada tanaman dewasa dapat menimbulkan mati pucuk dan infeksi pada daun dan batang yang menimbulkan busuk kering warna coklat kehitam-hitaman.

Penyakit antraknosa dapat dikendalikan dengan menggunakan fungisida alami. Dari penelitian yang dilakukan oleh Martinius (2010) daun rebusan serai wangi pada konsentrasi 5% mampu mengendalikan penyakit antraknosa.

Ekstrak dari daun pepaya juga memiliki kandungan zat aktif enzim papain dan fenol yang mampu menghambat perkembangan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur *C. capsici*.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun pepaya (*Carica papaya* L.) pada konsentrasi dan jenis kelamin tertentu mampu menghambat pertumbuhan jamur *Colletotrichum capsici* penyebab penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah (*Capsicum annuum* L.).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annuum* L.)

1. Klasifikasi dan Deskripsi Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annuum* L.)

Tanaman cabai merah (*Capsicum annuum* L.) merupakan tanaman sayuran yang tergolong tanaman tahunan berbentuk perdu. Berasal dari benua Amerika tepatnya Amerika Selatan, kemudian menyebar ke Amerika Tengah dan Meksiko melalui bantuan hewan khususnya burung (aves). Menurut Cronquist (1981), klasifikasi tanaman cabai merah yaitu sebagai berikut:

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Anak kelas	: Asteridae
Bangsa	: Solanales
Suku	: Solanaceae
Marga	: <i>Capsicum</i>
Jenis	: <i>Capsicum annuum</i> .L.

Tanaman cabai (*Capsicum annuum* L.), umumnya dibudidayakan oleh petani di dataran rendah ataupun di dataran tinggi, di lahan sawah maupun ditegalan (Nawangsih dkk, 1995).

Tanaman cabai merah tumbuh tegak dengan tinggi 50-90 cm, Bunga cabai berbentuk seperti terompet, corong, atau bintang, termasuk dalam bunga lengkap yang memiliki tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Selain itu karena memiliki benang sari dan putik dalam satu tangkai maka bunga cabai juga termasuk bunga berkelamin ganda. Bunga cabai tumbuh pada bagian ketiak daun (Tarigan dan Wiryanta, 2003). Bunga cabai tumbuh dalam posisi menggantung dengan panjang tangkai bunga 1-2 cm, mahkota bunga terdiri dari 5-6 helai petala berwarna putih dengan panjang 1-1,5 cm dan lebar 0,5 cm, benang sari berjumlah 5-6 buah terdiri dari kepala sari yang berwarna biru atau ungu dan tangkai sari berwarna putih dengan panjang sekitar 0,5 cm, putik terdiri dari kepala putik yang berwarna kuning kehijauan dan tangkai putik berwarna putih dengan panjang sekitar 0,5 cm (Setiadi, 2006).

Buah cabai merah berbentuk memanjang atau panjang bergelombang, dengan panjang buah sekitar 11-14 cm dan tekstur mulus untuk cabai besar, berwarna hijau saat masih muda dan berwarna merah, kuning, atau oranye saat buah masak tergantung dari varietasnya, sedangkan biji cabai berbentuk bulat, pipih, dan terdapat bagian yang sedikit runcing, memiliki diameter 3-5 mm (Tarigan dan Wiryanta, 2003).

Batang utama tanaman cabai tumbuh tegak, pangkalnya berkayu, dan memiliki banyak cabang, dengan lebar tajuk mencapai 90 cm. Memiliki daun yang umumnya berbentuk lonjong, bulat telur dan oval, dengan ujungnya yang meruncing, dengan panjang 4- 10 cm dan lebar 1,5-4 cm, berwarna hijau muda atau hijau gelap tergantung dari varietasnya, memiliki pertulangan daun menyirip dan letaknya berselang - seling. Tangkai daunnya memiliki panjang 1,5-4,5 cm dengan posisi miring atau horizontal (Tarigan dan Wiryanta 2003).

Sistem perakaran tanaman cabai merupakan perakaran tunggang yang agak menyebar dan terdiri dari akar utama (primer) dan akar lateral dengan serabut akar. Akar cabai mampu tumbuh menyebar selebar 45 cm dan sedalam 50 cm (Harpenas dan Dermawan, 2010).

Kemampuan adaptasi tanaman cabai sangat baik pada berbagai jenis lahan seperti, lahan sawah (basah), tegalan (kering), pinggir laut (dataran rendah), atau pun daerah pegunungan (dataran tinggi) hingga ketinggian 1300 m dpl, dan tanaman cabai juga mampu beradaptasi pada berbagai jenis tanah mulai dari tanah liat hingga tanah berpasir. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya genangan air pada lahan bertanam, hal ini dapat meningkatkan resiko terserang penyakit akar dan kerontokan daun, selain itu, kelembaban udara yang tinggi dapat meningkatkan penyebaran dan perkembangan hama serta penyakit tanaman (Harpenas dan Dermawan, 2010).

B. Penyakit Antraknosa

Penyakit antraknosa dapat menyerang buah cabai yang muda melalui luka akibat lalat buah. Gejala yang ditunjukkan pada tanaman cabai yang terkena penyakit yaitu noda lekukan berwarna hitam kelam pada buahnya dan dapat pula pada batang, ranting serta daunnya. Penyakit antraknosa dapat ditularkan melalui biji atau benih yang ditanam. Serangan dari penyakit ini dapat merusak tanaman sehingga buahnya tidak dapat dijual. Buah yang terserang penyakit ini biasanya berwarna kehitam-hitaman dan berkerut, seperti gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1: Buah cabai merah yang terserang penyakit antraknosa akibat infeksi jamur *C.capsici*, (Sunaryono, 2003).

Dua jenis cabai yang dibudidayakan di Indonesia yaitu cabai besar dengan buah-buah yang menggantung (*Capsicum annum* L.) dan cabai kecil (cabai rawit) dengan buah – buah tegak tidak menggantung (*Capsicum frutescens* L.) masing-masing mempunyai banyak jenis (varietas), paprika juga merupakan satu jenis dari cabai besar (*Capsicum annum* L.).

C. Jamur *Colletotrichum capsici*

Jamur *Colletotrichum capsici* merupakan salah satu jamur yang dapat menyebabkan penyakit antraknosa. Jenis jamur ini mempunyai kisaran inang yang luas dan dapat menyerang banyak tanaman. Jamur ini banyak menyerang tanaman cabai sehingga dapat mengurangi produksi buah cabai di Indonesia (Chen Baoli,2005).

Colletotrichum capsici terbawa oleh biji dan mungkin dapat bertahan pada sisa- sisa tanaman sakit selama satu musim. Jamur yang menyerang daun dan batang kelak dapat menginfeksi buah cabai. Jamur pada buah masuk kedalam ruang biji dan menginfeksi biji, kemudian jamur akan menginfeksi semai yang tumbuh dari biji (benih) yang berasal dari buah yang sakit. Penyakit ini dapat timbul pada tanaman muda di persemaian meskipun cenderung lebih banyak pada tanaman tua. Penyakit dibantu oleh cuaca yang panas dan basah (Ripangi, 2012).

Klasifikasi jamur *Colletotrichum capsici* menurut Alexopoulous *et al.*, (1996), yaitu :

Kerajaan	: Fungi
Filum	: Ascomycota
Kelas	: Ascomycetes
Bangsa	: Melanconiales
Suku	: Melanconiaceae
Marga	: <i>Colletotrichum</i>
Jenis	: <i>Colletotrichum capsici</i> Butler (Syd.) & Bisby

Jamur *Colletotrichum capsici* membentuk konidium berbentuk gada panjang, bersekat 3-12, dengan ukuran 60-200 x 3-5 μm . Konidiofor pendek, bersekat 1-3. Daur penyakit *Colletotrichum capsici* terbawa oleh biji dan mungkin dapat bertahan pada sisa- sisa tanaman sakit selama satu musim. Penyakit ini juga banyak terdapat di daerah transmigrasi Lampung, dan dianggap sebagai penyakit yang merugikan (Suhardi, 1988). Pada tahun 1983 antraknosa berkembang dengan hebat di Kabupaten Demak pada tanaman cabai yang ditanam diluar musimnya (Januari atau Februari) dan menyebabkan terjadinya kerugian 5-65% (Suhardi, 1984). Diberitahukan penyakit ini juga umum terdapat di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina (Benigno dan Quebral, 1977).

Jamur pada buah masuk ke dalam ruang biji dan menginfeksi biji. Kemudian jamur menginfeksi semai yang tumbuh dari biji buah sakit. Jamur menyerang daun dan batang hingga akhirnya dapat menginfeksi buah-buah. Jamur jarang sekali mengganggu tanaman yang sedang tumbuh, tetapi menggunakan tanaman ini untuk bertahan sampai terbentuknya buah hijau. Selain itu jamur dapat mempertahankan diri dalam sisa-sisa tanaman sakit, selanjutnya konidium disebarkan oleh angin. Menurut Nur Imah Sidik dan Nurhadi (1986), infeksi *C. capsici* terjadi hanya melalui luka-luka.

Penyakit *C. capsici* jarang ditemukan pada musim kemarau dan dilahan yang mempunyai drainase baik. Menurut Astuti dan Suhardi (1986), perkembangan bercak dari penyakit tersebut paling baik terjadi pada suhu 30°C. Buah cabai yang masih muda cenderung lebih rentan daripada yang

setengah masak. Tetapi Pusposendjojo dan Rasyid (1985) menyatakan bahwa perkembangan bercak karena *C. capsici* lebih cepat terjadi pada buah yang lebih tua, meskipun buah muda lebih cepat gugur karena infeksi ini.

D. Fungisida

Penyakit yang disebabkan oleh jamur *C. capsici* dapat dikendalikan dengan penyemprotan fungisida. Fungisida tembaga memberikan hasil yang baik. Benlate (benomyl) dan topsin (tiofanat metil) dapat memberantas bercak daun dengan efektif. Dari percobaan Suhardi (1988) terlihat bahwa Antracol (propineb) kurang baik untuk memberantas penyakit ini, tetapi dapat memberikan produksi buah yang paling tinggi.

Menurut Hadisutrisno dan Indriyati, (1982), Velimek (campuran Maneb dan Zineb) memberikan hasil yang baik. Penyakit dapat dikendalikan dengan tidak menanam biji yang terinfeksi. Buah-buah yang terinfeksi tidak diambil bijinya. Biji dapat diobati dengan Thiram 0,2%, yang menurut Grover dan Bansal (1970), di India obat tersebut dapat mematikan jamur tanpa mempengaruhi perkecambahan benih. Jika diperlukan penyakit dapat dikendalikan dengan penyemprotan fungisida. Berbagai macam fungisida dapat dipakai untuk keperluan ini, antara lain Antracol (propineb), Velimek (maneb dan zineb), Delsene MX-200 (karbendazim dan mankozeb), dan fungisida tembaga, (Hadisutrisno dan Indriyati, 1982)

Fungisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan cendawan (fungi). Fungisida umumnya dibagi menurut cara kerjanya di dalam tubuh

tanaman sasaran yang diaplikasi, yakni fungisida nonsistemik, sistemik, dan sistemik lokal. Penerapan fungisida sistemik dan non sistemik, erat hubungannya dengan sifat dan aktifitas fungisida terhadap jasad sasarannya (Hadisutrisno dan Indriyati, 1982)

1. Fungisida Nonsistemik

Fungisida nonsistemik tidak dapat diserap dan ditranslokasikan di dalam jaringan tanaman. Fungisida nonsistemik hanya membentuk lapisan penghalang di permukaan tanaman (umumnya daun) tempat fungisida disemprotkan. Fungisida ini hanya berfungsi mencegah infeksi cendawan dengan cara menghambat perkecambahan spora atau miselia jamur yang menempel di permukaan tanaman. Karena itu, fungisida kontak berfungsi sebagai protektan dan hanya efektif bila digunakan sebelum tanaman terinfeksi oleh penyakit. Akibatnya, fungisida nonsistemik harus sering diaplikasikan agar tanaman secara terus-menerus terlindungi dari infeksi baru.

2. Fungisida Sistemik

Fungisida sistemik diabsorpsi oleh organ-organ tanaman dan ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya melalui pembuluh angkut maupun melalui jalur simplas (melalui dalam sel). Pada umumnya fungisida sistemik ditranslokasikan ke bagian atas (akropetal), yakni dari organ akar ke daun. Beberapa fungisida sistemik juga dapat bergerak ke bawah, yakni dari daun ke akar (basipetal).

Kelebihan fungisida sistemik antara lain :

Bahan aktif langsung menuju ke pusat infeksi didalam jaringan tanaman, sehingga mampu menghambat infeksi cendawan yang sudah menyerang di dalam jaringan tanaman. Fungisida ini dengan cepat diserap oleh jaringan tanaman kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman sehingga bahan aktif dan residunya tidak terlalu tergantung pada *coverage* semprotan, selain itu bahan aktif juga tidak tercuci oleh hujan. Oleh karena itu, aplikasinya tidak perlu terlalu sering.

3. Fungisida Sistemik Lokal

Fungisida sistemik lokal diabsorpsi oleh jaringan tanaman, tetapi tidak ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya. Bahan aktif hanya akan terserap ke sel-sel jaringan yang tidak terlalu dalam dan tidak sampai masuk hingga pembuluh angkut.

Fungsi Fungisida adalah untuk membasmi jamur yang menyerang tanaman baik pada akar, batang ataupun daun. Sedangkan bakterisida adalah pembunuh bakteri penyebab penyakit busuk bagian tanaman. Serangan jamur dan bakteri ini biasanya terjadi karena tanah yang terlalu basah, terlalu asam, ataupun luka tanaman akibat gesekan, himpitan, goresan. Berbagai tanaman yang sering diserang jamur adalah tomat, cabai, dan kentang ataupun tanaman lain (Hadisutrisno dan Indriyati, 1982)

E. Tanaman Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi tanaman pepaya menurut Cronquist (1981) adalah sebagai berikut

:

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Violales
Suku	: Caricaceae
Marga	: <i>Carica</i>
Jenis	: <i>Carica papaya</i> L.

Tanaman pepaya (*Carica papaya* L.) ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Pusat penyebaran tanaman ini berada di daerah sekitar Meksiko bagian Selatan dan Nikaragua. Tanaman pepaya ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber buah segar, bahan sayuran serta bahan obat tradisional. Batang, daun dan buah pepaya mengandung getah bewarna putih. Getah ini mengandung suatu enzim pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut *papain* (Kalie, 1996).

Terdapat lebih dari 50 asam amino di dalam getah pepaya, antara lain asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, valine, saponin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, histidin, lysin, arginin, triptophan, dan sistein. Di dalam getah pepaya juga terkandung enzim papain, suatu enzim yang berfungsi memecah protein atau yang disebut dengan enzim proteolitik. Enzim papain banyak digunakan dalam berbagai proses industri seperti

industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, dan penyamak. Di Indonesia, tanaman pepaya mampu tumbuh dan menyebar di kawasan dataran rendah hingga dataran tinggi, yaitu hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (Indriyani dkk., 2008).

Buah pepaya matang mengandung sejumlah zat gizi penting terutama vitamin A. Setiap 0,5 kg buah pepaya terkandung nutrisi: protein (2,5 gram), karbohidrat (46 gram), lemak (0,5 gram), vitamin A (10.000 SI), vitamin C (300 mg), thiamin (0,30 mg), riboflavin (0,27 mg), niasin (1,75 mg), kalsium (0,15 gram), magnesium (0,25 gram), potassium (1,15 gram), belerang (0,15 gram), fosfor (0,47 gram), zat besi (0,02 gram), silicon (0,02 gram), klorin (0,12 gram), sodium (0,2 gram), dan air (399 gram). Selain baik untuk kesehatan tubuh, di antara manfaat penting buah pepaya yaitu berkaitan dengan perawatan kulit. Selain itu, jus buah pepaya yang matang dan berwarna merah juga baik untuk kesehatan mata. Sementara untuk buah yang muda bisa dimanfaatkan air getahnya untuk menghilangkan dan menyembuhkan kaki yang pecah-pecah (Indriyani dkk., 2008).

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung pada Desember 2015 sampai Maret 2016.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, tabung reaksi, jarum ose, gelas benda, gelas penutup, labu erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, corong, pipet tetes, pinset, bunsen, stirer, mikroskop, neraca analitik, vortex mixer, kompor listrik, autoklaf, inkubator, oven, lemari es, aluminium foil, kertas saring, polybag, semprotan, penggaris, korek api, hemositometer, gunting, dan alat tulis.

Bahan yang digunakan adalah 100 gram ekstrak daun pepaya (*Carica papaya* L.) yaitu pepaya dengan jenis kelamin jantan, betina, dan hermaphrodit, benih tanaman cabai merah (*Capsicum annuum* L.), isolat murni jamur *Colletotrichum capsici* yang berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB), alkohol 70%, aquades, spiritus, media PDA, tanah, dan pupuk kandang.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok faktorial dengan 3 ulangan dimana ulangan sebagai kelompok. Faktor yang digunakan dalam penelitian yaitu, faktor A konsentrasi ekstrak daun pepaya dan faktor B jenis kelamin tanaman pepaya. Taraf konsentrasi ekstrak daun pepaya ada 6 yaitu 0% (A0), 1% (A1), 2% (A2), 3% (A3), 4% (A4), dan 5% (A5), jenis kelamin pepaya ada 3 taraf yaitu pepaya betina (B1), hermaphrodit (B2), jantan (B3). Sehingga didapatkan $6 \times 3 = 18$ perlakuan, untuk setiap ulangan ditanami 3 bibit tanaman cabai merah.

D. Prosedur Penelitian

1. Pembuatan Media (Potato Dextrose Agar) PDA

Media (Potato Dextrose Agar) PDA sebagai media isolasi dan pembiakan jamur *C.capsici*. Sebanyak 500 gram kentang yang telah dibersihkan dan dibuang kulitnya dipotong dadu kecil. Kemudian kentang direbus dalam 500 ml aquades selama 2 jam, setelah itu air rebusan disaring dari kotoran atau potongan kentang. Kemudian air rebusan kentang itu dipanaskan kembali dan ditambahkan dengan 20 gram dekstrosa, 15 gram agar-agar dan aquades hingga volumenya menjadi 1000 ml. Larutan tersebut diaduk hingga homogen, setelah itu media ditaruh ke dalam labu erlenmeyer, lalu tutup dengan sumbat kapas dan aluminium foil. Kemudian media disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit dengan suhu 121 °C dan tekanan 2 atm. Setelah itu media dapat langsung digunakan.

2. Perbanyak Isolat murni jamur *Colletotrichum capsici*

Koloni jamur diambil dari isolat murni jamur *Colletotrichum capsici* yang diperoleh dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian isolat murni jamur *Colletotrichum capsici* diinokulasikan ke cawan petri berisi media PDA dan diinkubasi selama $\pm$ 5 hari pada suhu 28-30° C.

3. Penyiapan Media Tanam

Media tanam yang digunakan untuk penanaman benih cabai merah berupa campuran antara tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1 yang dimasukkan ke dalam polybag besar dengan ukuran diameter 25 cm dan tinggi 30 cm.

4. Penyemaian Biji Cabai Merah

Biji cabai merah yang akan disemai direndam air selama 12 jam dan dipilih biji cabai yang tenggelam. Kemudian biji cabai merah diletakkan di atas cawan petri yang berisi kapas dan kertas merang selama 10 hari sampai kecambah siap dipindahkan ke media tanam.

5. Penanaman Bibitcabai merah

Kecambahbibit cabai merah yang normal dan sehat dipilih dan dipindahkan ke polybag besar dengan ukuran diameter 25 cm dan tinggi 30 cm berisi media tanah. Kemudian kecambah ditanam dengan kedalaman 1 cm, setiap polybag dalam perlakuan berisi 3 bibit cabai merah. Bibit cabai merah yang sudah ditanam disiram setiap pagi dan sore secukupnya untuk menjaga ketersediaan air.

6. Pembuatan Ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya*L)

Ekstrak daun pepaya (*Carica papaya* L.) dibuat dengan menggunakan aquades sebagai bahan pelarut. Daun pepaya dari 3 jenis kelamin yang berbeda dicuci bersih, diiris tipis kemudian dikering anginkan di tempat yang ternaungi, terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah kering, irisan daun dihancurkan menjadi serbuk menggunakan blender sampai didapatkan tepung daun pepaya. Tepung daun pepaya ditimbang 100g,di masukkan kedalam kantong yang diberi label sesuai dengan jenis kelamin pepaya .

7. Inokulasi

Biakan *C. capsici* yang berumur 14 hari dikerok kemudian ditambah air steril sampai mencapai kerapatan konidia *C. capsici* 10^6 Spora/ml.

Suspensi *C. capsici* tersebut disemprotkan ke tanaman cabai merah dan tanah pada polybag dua minggu sebelum penyemprotan ekstrak daun pepaya pertama kali.

8. Aplikasi Ekstrak Daun Pepaya

Ekstrak daun pepaya sesuai perlakuan diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada tanaman yang telah dipersiapkan di polybag pada saat tanaman mulai berumur tiga minggu dalam polybag. Konsentrasi yang digunakan adalah 1%, 2%, 3%, 4%,5% untuk masing-masing ekstrak daun pepaya dari 3 jenis kelamin yang berbeda.

9. Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada satu minggu setelah aplikasi ekstrak daun pepaya karena pada saat itu gejala pertama kali muncul. Intensitas penyakit adalah tingkat kerusakan tanaman karena adanya serangan patogen atau adanya penyakit. Intensitas penyakit terdiri dari keterjadian penyakit (*disease incidence*) dan keparahan penyakit (*disease severity*), (Efri, 2005), sehingga peubah yang diamati yaitu :

1. Keterjadian penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah

$$TP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

TP = Keterjadian penyakit (%)

n = Jumlah tanaman yang terinfeksi / bergejala

N = Jumlah total tanaman yang diamati

2. Keparahannya penyakit antraknosa pada tanaman cabe merah

$$KP = \frac{\sum(n \times v)}{N \times V} \times 100\%$$

KP = Keparahannya serangan (%)

n = Banyaknya tanaman dalam setiap kategori serangan

N = Jumlah tanaman yang diamati

v = Nilai numerik untuk tiap kategori serangan

V = Nilai skor tertinggi

Skor penyakit yang digunakan adalah

0 = Tanpa serangan

1 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 0 – 20 % tanaman

2 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 20 – 40 % tanaman

3 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 40 – 60 % tanaman

4 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 60 -80 % tanaman

5 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 80 -100 % tanaman

3. Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai ujung titik tumbuh tanaman. Satuan pengukuran adalah centimeter (cm).

4. Berat basah

Perhitungan bobot basah dilakukan saat tanaman selesai dipanen langsung dilakukan perhitungan. Satuan pengukuran adalah gram (gr).

E. Analisis Data

Analisis statistik dilakukan terhadap keterjadian, keparahan penyakit, tinggi tanaman, dan berat basah tanaman cabai merah. Rancangan percobaan berupa Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial. Faktor A yaitu konsentrasi ekstrak daun pepaya dengan 6 taraf 0% (A0), 1% (A1), 2% (A2), 3% (A3), 4% (A4), dan 5% (A5) dan faktor B adalah jenis kelamin ekstrak daun pepaya dengan 3 taraf jenis kelamin betina (B1), hermaprodit (B2), jantan (B3), dengan ulangan sebanyak 3 kali. Dilakukan uji homogenitas (bartlett), apabila terjadi perbedaan nyata pada faktor A dan

faktor B, serta terdapat interaksi maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsentrasi ekstrak daun pepaya 5 % (A5) merupakan konsentrasi yang terbaik dalam menekan perkembangan penyakit antraknosa tanaman cabai merah yang disebabkan oleh jamur *Colletotrichum capsici*.
2. Ekstrak daun pepaya jenis kelamin betina (B1) merupakan ekstrak yang terbaik dalam menekan perkembangan penyakit antraknosa tanaman cabai merah yang disebabkan oleh jamur *Colletotrichum capsici*.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk mengetahui keefektifan ekstrak daun pepaya jantan sebagai fungisida alami terhadap jamur *Colletotrichum capsici* penyebab penyakit antraknosa pada tanaman cabai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrios, G.N. 1997. Plant Pathology. Academic Press. New York.
- Alexopoulos, C., Miim sand Blackwell. 1996. *Introductory Mycology*. New York. Champman and Hall. Limited. London.
- A'yun, Q. dan A. N. Laily. 2015. Analisis Fitokimia Daun Pepaya (*Carica papaya* L.) Di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Kendalpayak, Malang. FKIP UNS. Solo.
- Benigno, D.R.A. and F.C. Quebral. 1977, Host Index of PT. Diseases in the Philippines. Univ. Philipp. Coll. Agric., Banos, 182 hlm.
- Bosland, P.W. and E.J. Votava. 2000. *Peppers : Vegetable and Spice Capsicums*, CABI Publishing. Wallingford. 204p.
- Astuti, E.B dan Suhardi. 1986, Pengaruh suhu dan penyimpanan dan kematangan buah terhadap antraknose pada lombok. Bul. Penel. Hort. 13 (3): 41-50.
- Chen Baoli. 2005. Screening Sweet Pepper For Resistance to Anthracnose Caused by *Colletotrichum capsici*. www.arc-avrdc.Org/PDF-Files/Chen Baoli (P-N).pdf.
- Cronquist, A. 1981. *An Integrated System of Clasification of Flowering Plants*. Columbia University Press. New York. 1262 Hlm.
- Efri. 2005. Pengaruh Ekstrak Berbagai Tanaman Mengkudu terhadap Perkembangan Penyakit Antraknosa Pada Tanaman Cabai. *Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, Vol. 10, No. 1: 52 – 58.
- Grover, R.K. and R.D. Bansal. 1970, Seed-Bome Nature of *Colletotrichum capsici* in chilli seeds and its control by seed dressing fungicides. Indian phytopath. 23:664-668.
- Hadisutrisno, B. dan Rien Indriyati. 1982, Pengujian efektivitas fungisida Velimek 80 WP terhadap penyakit antraknose buah (*Colletotrichum capsici*) dan penyakit bercak daun (*Cercospora capsici*) pada tanaman cabai merah *Capsicum annum*. Dep. Fitopatologi, Fak. Pert., Univ. Gadjah Mada.

- Harpenas, Asep dan R. Dermawan. 2010. *Budidaya Cabai Unggul, Cabai Besar, Cabai Keriting, Cabai Rawit, dan Paprika*. Penebar Swadaya. Bogor.
- Harjadi, S.S. 1991. *Pengantar Agro-nomi*. Gramedia. Jakarta.
- Indriyani, N. L. P., Affandi, D. Sunarwati. 2008. *Pengelolaan Kebun Pepaya Sehat*. Solok: Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
- Jeffries P, Dodd JC, Jegerand MJ & Plumbley RA. 1990. The biology and control of *Colletotrichum* species on tropical fruit crops. *Plant Pathology* 39(3): 343-366.
- Juliantara, K. 2012. Pemanfaatan Ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya*) sebagai Pestisida Alami yang Ramah Lingkungan.
- Kalie, M.B. 1996. *Bertanam Pepaya*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Lakitan, B. 1993. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 205 hal.
- Lisnawita, 2003. *Penggunaan Tanaman Resisten; Suatu Strategi Pengendalian Nematoda Parasit Tanaman*. Laporan penelitian 2003 digitized by USU digital library.
- Martinius., Yenny Liswarni., Yanuar Miska. 2010. Uji Konsentrasi Air Rebusan Daun Serai Wangi Terhadap Pertumbuhan Jamur *Colletotrichum gloeosporioides* Penz. Penyebab Penyakit Antraknosa Pada Pepaya Secara *In Vitro*. Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang 25163.
- Musfiroh, I., Mutakin, Treesye Angelina, Muchtaridi. 2013. Capsaicin Level of Varios Capsicum Fruits.
- Nawangsih, A.A., H.P. Imdad., dan A. Wahyudi. 1995. *Cabai Hot Beauty*. Penebar Swadaya. Jakarta. 114 hlm.
- Nechiyana., A. Sutikto, dan D. Salbiah. 2013. *Penggunaan Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) Untuk Mengendalikan Hama Kutu Daun (Aphis gossypii Glover) Pada Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.)*. Artikel. Riau.
- Nur Imah Sidik dan Nurhadi. 1986, Efikasi Fungisida Terhadap Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum capsici*) pada buah lombok besar (*Capsicum annum*) horticultura No 17:575-579.
- Nurfadilah, S. 2013. Pertumbuhan dan Perkembangan Bibit *Rhynchostylis retusa* L. (Bl.) Orchidaceae pada Buletin Kebun Raya Vol:16 No 1.
- Osborn AE. 1996. Saponins and Plant Defence-A soap story. *Trends Plant Science* 1: 4-9

Pablito, M., Magdalita., and Charles. P. Mercado. 2003. Determining The Sex Of Papaya For Improved Production. University of the Philippines at Los Banos College, Laguna, Philippines

Pakdeevaporn P, Wasee S, Taylor PWJ & Mongkolporn O. 2005. Inheritance of resistance to anthracnose caused by *Colletotrichum capsici* in *Capsicum*. *Plant Breeding* 124(2): 206-208.

Poulos, J.M. 1994. *Capsicum* L., p. 136-140. In: J.S. Siemonsma and Kasem Pelook (Eds.) *Prosea Vegetables*. Prosea Indonesia. Bogor.

Pusposendjojo, N. dan B.A Rasyid. 1985, Perkembangan *Colletotrichum capsici* pada berbagai tingkatan umur buah lombok (*Capsicum annum*L.). Kongr. Nas. VIII PFI. Cibubur, Jakarta, Okt. 1985.

Raj A, Sing N, Metha PK. GeneXpert MTB/RIF assay: a new hope for extrapulmonary tuberculosis. *IOSR Journal of Pharmacy*. 2012;2(1):083-089.

Ripangi, A. 2012. *Budidaya Cabai*. PT. Buku Kita. Jakarta. 97 hlm.

Robinson T. 1991. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Penerjemah: Kosasih. Bandung: Penerbit ITB

Rubatzky, V. dan M. Yamaguchi. 1997. *Sayuran Dunia* Jilid 3. Penerbit ITB. Bandung.

Semangun, Haryono. 2001. *Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Semangun, H. 1991. *Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.

Semangun, H. 1996. *Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.

Semangun H, 2000. *Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia*. Cetakan keempat. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 151-158

Setiadi, 2006. *Bertanam Cabai*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Suhardi. 1984. Serangan Penyakit Antraknosa pada tanaman Lombok di Kabupaten Demak. *Warta Penel. Pengembangan pertanian* 6(6):4-5.

Suhardi, (Ed). 1988, Laporan survai hama dan penyakit serta penggunaan pestisida pada sayuran dataran rendah di Indonesia. Kerjasama proyek ATA-395. dan Balai Penel. Hortik, Lembang

- Sunaryono, Hendro H.2003. *Budidaya Cabai Merah*. SinarBaru Algensindo. Cetakan Ke V. Bandung. 46 Hlm.
- Suryaningsih E, Sutarya R, Duriat AS. 1996. *Penyakit Tanaman Cabai Merah dan Pengendaliannya, dalam Teknologi Produksi Cabai Merah, A.S.*
- Suriawiria. 2002. *Tanaman Berkhasiat sebagai Obat*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Tarigan, S. dan Wahyu Wiryanta. 2003. *Bertanam Cabai Hibrida Secara Intensif*. AgroMedia Pustaka. Jakarta
- Than PP, Prihastuti H, Phoulivong S, Taylor PWJ & Hyde KD. 2008. Chili anthracnose disease caused by *Colletotrichum* species. *J. Zhejiang Univ. Sci. B.* 9(10): 764-778.
- Widyastuti S. 1996. Penghambatan Penyakit Damping off pada Pinus Dengan Ekstrak Biji Nyiri. *Perlindungan Tanaman Indonesia.* 2(1):32-35.
- Wijayani, Ari dan Didik Indradewa.2004 Deteksi Kahat Hara N, P, K, Mg dan Ca pada Tanaman Bunga Matahari dengan Sistem Hidroponik. Yogyakarta. Universitas Negri Sebelas Maret.
- Yoshida, S., S. Hiradate., Y. Fuji, and A. Sharanata. 2000. *Colletotrichum dematium* Produces Phytotoxin in Anthracnose Lesion of Mulberry Leaves. *Phytopathology* 90:285-291.