

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Angka kejadian dermatitis seboroik tertinggi pada kelompok usia 63 sampai 72 tahun sebanyak (31,3%).
2. Pria sebanyak 56,3% lebih sering menderita penyakit dermatitis seboroik dibandingkan wanita 43,8%.
3. Pekerjaan paling dominan dari keseluruhan responden adalah pensiunan yaitu sebanyak 28,1%.
4. Responden dengan tipe lokasi lesi dermatitis seboroik di wajah memiliki persentase tertinggi yaitu 43,8%.
5. Proporsi tingkat kualitas hidup pada responden dermatitis seboroik tidak ada efek sebesar 6,3%, efek kecil sebesar 28,1%, efek sedang sebesar 37,5%, efek besar sebesar 28,1%, dan efek sangat besar sebesar 0%.
6. Tidak terdapat hubungan antar lokasi lesi dermatitis seboroik dengan kualitas hidup dengan nilai *p-value* sebesar 1.
7. Dermatitis seboroik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien.

5.2 Saran

Bagi peneliti lain,

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan derajat keparahan dermatitis

seboroi dengan kualitas hidup dengan menggunakan pengukuran derajat keparahan.

Agar sampel yang

digunakan memenuhi semua tingkat derajat keparahan dan sebaran data yang

didapat merata.