

ABSTRACT

POOR FAMILY SUPPORT AS A RISK FACTOR FOR THE INCOMPLETENESS OF MOTHERS'S ANTENATAL CARE (ANC) VISITS IN PUSKESMAS SUKAMAJU BANDAR LAMPUNG

By

AYU INDAH RACHMAWATI

Background: Maternal mortality (MMR) in Indonesia have not reached a predetermined target. Complications of pregnancy and childbirth as the cause of maternal death can be prevented by antenatal care (ANC) visits. One of the factor that suspected affecting the completeness of an ANC visits is family support. This study aims to determine the relationship between family support and the completeness of mother's ANC visits in Puskesmas Sukamaju Bandar Lampung .

Method: This study used a quantitative analytical research with case control method. The sample in this study consisted of 60 mothers, divided into case and control group with 30 mothers in each group. The sampling technique that used in this research is the purposive sampling technique. This research instruments are a family support questionnaire that consists of 45 questions, and a list of maternal data from Puskesmas Sukamaju besides KIA book's that every mother had. The hypothesis test used in this study is chi square test.

Result: The result showed that from 30 respondents in case group there were 21 mothers (70%) who had poor family support and 9 mothers (30%) who had good family support. While from 30 respondents in control group there were 7 mothers (23,3%) with poor family support and 23 mothers (76,7%) with good family support. The result obtained in chi-square test in p-value is 0,001 and odds ratio (OR) test is 7,7 with CI 95% 2,424-24,245.

Conclusion: The risk of mother with poor family support for the incompleteness of an ANC visits at the Puskesmas Sukamaju Bandar Lampung is 7.7 times greater than mother with good family support.

Keywords: antenatal care (ANC), family support, pregnant mother.

ABSTRAK

DUKUNGAN KELUARGA TIDAK BAIK SEBAGAI FAKTOR RISIKO KETIDAKLENGKAPAN KUNJUNGAN *ANTENATAL CARE* (ANC) IBU DI PUSKESMAS SUKAMAJU BANDAR LAMPUNG

Oleh

AYU INDAH RACHMAWATI

Latar Belakang: Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Komplikasi kehamilan dan persalinan sebagai penyebab kematian ibu tersebut dapat dicegah dengan melakukan kunjungan *antenatal care* (ANC). Salah satu faktor yang diduga dapat memengaruhi kelengkapan kunjungan ANC adalah dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kelengkapan kunjungan ANC di Puskesmas Sukamaju Bandar Lampung

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan metode *case control*. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 60 orang ibu, dengan masing-masing 30 orang ibu pada kelompok kasus dan kontrol. Pemilihan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner dukungan keluarga yang terdiri dari 45 pertanyaan, serta kartu ibu di Puskesmas Sukamaju dan buku KIA milik ibu. Uji hipotesis yang digunakan adalah *chi square*.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden kelompok kasus terdapat 21 orang (70%) mendapat dukungan keluarga tidak baik dan 9 orang (30%) mendapat dukungan keluarga baik. Sedangkan dari 30 responden kelompok kontrol terdapat 7 orang (23,3%) dengan dukungan keluarga tidak baik dan 23 orang (76,7%) dengan dukungan keluarga baik. Hasil uji *chi square* didapatkan nilai *p-value* 0,001 dan *odds ratio* sebesar 7,7 dengan IK 95% 2,424-24,245.

Simpulan: Besar risiko dukungan keluarga yang tidak baik untuk terjadinya ketidaklengkapan kunjungan ANC Ibu di Puskesmas Sukamaju Bandar Lampung adalah 7,7 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu dengan dukungan keluarga yang baik.

Kata kunci: antenatal care, dukungan keluarga, ibu hamil.