DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Rekapitulasi hasil analisis ragam pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi untuk induksi pembungaan dini pada tanaman ubi kayu umur muda. 25

2. Nilai tengah pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi pada peubah tinggi tanaman dan bobot kering batang tanaman ubi kayu umur muda. 26

3. Pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi pada tinggi tanaman ubi kayu umur 8 dan 13 minggu setelah tanam. 27

4. Pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi pada jumlah daun tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 31

5. Pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi pada jumlah buku tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 33

6. Pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi pada tingkat kehijauan daun ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 35

7. Pengaruh pemberian *paclobutrazol* melalui daun dalam berbagai frekuensi aplikasi pada bobot kering batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 40

8. Deskripsi Ubi Kayu Varietas UJ-3 (Thailand). 56

9. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman ubi kayu umur 8 minggu setelah tanam. 57

10. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah daun tanaman ubi kayu umur 8 minggu setelah tanam. 57

11. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah buku tanaman ubi kayu umur 8 minggu setelah tanam. 57

12. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 58

13. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah daun tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 58

14. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah buku tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 58

15. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot basah batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 59

16. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot basah daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 59

17. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot basah ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 59

18. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot kering batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 60

19. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot kering daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 60

20. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot kering ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 60

21. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot basah batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 61

22. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot basah daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 61

23. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot basah ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 61

24. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot kering batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 62

25. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot kering daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 62

26. Data pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata bobot kering ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi √x). 62

27. Rekapitulasi uji Barlett untuk homogenitas ragam antarperlakuan. 63

28. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman ubi kayu umur 8 minggu setelah tanam. 64

29. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah daun tanaman ubi kayu umur 8 minggu setelah tanam. 64

30. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah buku tanaman ubi kayu umur 8 minggu setelah tanam. 65

31. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 65

32. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah daun tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 66

33. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah buku tanaman ubi kayu umur 13 minggu setelah tanam. 66

34. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot basah batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 67

35. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot basah daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 67

36. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot basah ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 68

37. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot kering batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 68

38. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot kering daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 69

39. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot kering ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam. 69

40. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot basah batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 70

41. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot basah daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 70

42. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot basah ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 71

43. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot kering batang tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi $\sqrt{x}$). 71

44. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot kering daun tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi √x). 72

45. Analisis ragam untuk pengaruh berbagai frekuensi aplikasi *paclobutrazol* melalui daun (F $2X_1$; F $2X_2$; F $3X_1$; F $3X_2$ dan F 4X) pada bobot kering ubi tanaman ubi kayu umur 16 minggu setelah tanam (transformasi √x). 72