

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian pupuk kandang kambing dan pupuk kandang sapi sebagai pupuk dasar pada tanaman bawang merah tidak memberikan pengaruh nyata pada semua variabel pengamatan.
2. Pemberian pupuk NPK (16:16:16) dengan dosis 2,5 g/tan memberikan hasil yang lebih tinggi, ditunjukkan oleh variabel bobot umbi basah dan bobot umbi kering.
3. Jenis pupuk kandang yang berbeda mempengaruhi takaran dosis pupuk NPK yang digunakan. Pada variabel bobot umbi basah dan umbi kering, pemberian pupuk kandang kambing dengan takaran NPK 2,5 g dan 5 g menghasilkan bobot umbi yang lebih tinggi dibandingkan dengan NPK 7,5 g, tetapi pada pupuk kandang sapi serta tanpa pupuk kandang dengan takaran NPK 5 g menghasilkan bobot umbi yang lebih rendah dibandingkan dengan takaran dosis NPK 2,5 g dan 7,5 g.

5.2 Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian lanjutan pada percobaan ini adalah sebaiknya penelitian dilakukan di lahan terbuka agar dapat memperoleh kondisi lingkungan yang baik sehingga hasil yang didapat maksimal. Penggunaan bawang merah varietas “Tuk-tuk” sebaiknya digunakan pada saat kelangkaan bawang merah di pasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar.